

Incremento Cantidad de Fruta		
Aplicación 1		
Estado fenológico	Dosis (cc/ha)	Vía de aplicación
1 semana después de inicio de crecimiento vegetativo	500	Foliar
Aplicación 2		
Estado fenológico	Dosis (cc/ha)	Vía de aplicación
Crecimiento vegetativo	500	Foliar
Aplicación 3		
Estado fenológico	Dosis (cc/ha)	Vía de aplicación
Crecimiento vegetativo	500	Foliar
Aplicación 4		
Estado fenológico	Dosis (cc/ha)	Vía de aplicación
Inicio floración	500	Foliar
Aplicación 5		
Estado fenológico	Dosis (cc/ha)	Vía de aplicación
Plena floración	500	Foliar
Aplicación 6		
Estado fenológico	Dosis (cc/ha)	Vía de aplicación
Cuaja	500	Foliar

Aclaración:

Las aplicaciones 2 y 3 deben ser distribuidas de manera uniforme de acuerdo a cuándo se tenga estimado el inicio de floración. Es decir, si se calcula con 30 días para floración desde la primera aplicación, distribuir las 2 aplicaciones cada 15 días.

Incrementar calibre y homogeneización de racimo		
Aplicación 1		
Estado fenológico	Dosis (cc/ha)	Vía de aplicación
Floración 50%	500	Foliar
Aplicación 2		
Estado fenológico	Dosis (cc/ha)	Vía de aplicación
Cuaja	500	Foliar
Aplicación 3		
Estado fenológico	Dosis (cc/ha)	Vía de aplicación
Crecimiento de bayas 4–6 mm	500	Foliar
Aplicación 4		
Estado fenológico	Dosis (cc/ha)	Vía de aplicación
Crecimiento de bayas 12–14 mm	500	Foliar
Aplicación 5		
Estado fenológico	Dosis (cc/ha)	Vía de aplicación
Inicio ablande 5% / Inicio pinta 5%	500	Foliar
Aplicación 6		
Estado fenológico	Dosis (cc/ha)	Vía de aplicación
Ablande al 50% / Pinta 50%	500	Foliar